

1919

Lane Medical Library

Aus der inneren Abteilung des St. Elisabeth-
Krankenhauses zu Halle a. S.
Leitender Arzt: Prof. Dr. Winternitz.

Ein Fall von Bence Jonesscher Albuminurie mit multiplen Myelomen.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung
der medizinischen Doktorwürde
der hohen medizinischen Fakultät der vereinigten
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg
vorgelegt am 25. Oktober 1919 von
Hans Kirst aus Halle a. S.



Druck: Heinr. Rehmaan, Buchbinder.
1920.

Aus der inneren Abteilung des St. Elisabeth-
Krankenhauses zu Halle a. S.

Leitender Arzt: Prof. Dr. Winternitz.

Ein Fall von Bence Jonesscher Albuminurie mit multiplen Myelomen.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der medizinischen Doktorwürde

der hohen medizinischen Fakultät der verei-
inigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt am 25. Oktober 1919 von

Hans Kirst aus Halle a. S.



Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg.

Referent: Prof. Dr. Winternitz. Dekan: Geh. Rat
Prof. Dr. Schieck.

Meinen lieben Eltern.

Ein gut charakterisierter Fall, bei dem die Diagnose multiples Myelom schon bei Lebzeiten durch die Anwesenheit des Bence Jones'schen Eiweißkörpers gestellt werden konnte, gibt die Veranlassung zu den nachfolgenden Betrachtungen.

Es würde zu weit führen, auf alle bisher beschriebenen Fälle von Bence Jones'scher Albuminurie einzugehen, da die Literatur nach 1900 von Jahr zu Jahr erheblich zugenommen hat, und bisher über 100 Fälle veröffentlicht worden sind. Dies ist wohl dem Umstande zu verdanken, daß durch die Veröffentlichung fast jeden bekannt gewordenen Falles die Kenntnis dieser Krankheitserscheinungen in weitere Kreise getragen, und das Interesse dafür erweckt worden ist. Denn es gibt nur wenig Krankheiten, bei denen wir auf Grund eines abnormen chemischen Urinbefundes die Diagnose und den Sitz des vorliegenden Leidens so sicher erkennen können wie bei Anwesenheit des Bence Jones'schen Eiweißkörpers. Da bereits Arbeiten vorliegen, die die veröffentlichten Fälle zusammengefaßt und deren Inhalt genau angegeben haben, werde ich mich nur auf das beschränken, was mir von dem bisher Veröffentlichten für die Kenntnis der Krankheit wichtig zu sein scheint.

Im Jahre 1847 fand Bence Jones im Harn eines an ostreomalacischen Erscheinungen leidenden Patienten den später nach ihm benannten Eiweißkörper. Als Hauptcharakteristikum führte er die Gerinnung bei

50-60° Wärme an, die sich beim Kochen löste und in der Kälte wieder auftrat. Die in der Kälte erhaltene Fällung durch Salpetersäure löste sich beim Erhitzen. Im übrigen zeigte der Körper die Eigenschaften des Eiweißes. Der Kranke, der von Mac Intyre genau beobachtet worden war, hatte längere Zeit nach einem Unfall über quälende Schmerzen in Brust, Rücken und Lenden zu klagen. Objektiv bestanden große Blässe, Kyphose und Druckschmerzhaftigkeit der Rippen, der Wirbelfäule und des Beckens. Im Urin wurden neben dem vorhin charakterisierten Eiweißkörper, der etwa in $6,7\% = 73 \text{ g}$ pro die vorhanden war, mikroskopisch auch zuweilen Cylinder gefunden.

Durch Kühne wurde dann 1883 der Eiweißkörper, der bei einem von Stokvis 1869 beobachteten Falle von scheinbarer Osteomalacie wiedergefunden wurde, genau untersucht und als Hemialbumose identifiziert. Nach seiner Ansicht war es ein Körper, der seiner chemischen Stellung nach zwischen Eiweiß und Peptone eingereiht werden kann. Es gelang ihm bei Verdauungsversuchen, Pepton, Tyrosin und Leucin daraus abzuspalten. Seit jener Zeit sprach man von Bence Jones'scher Hemialbumosurie.

Von besonderem Interesse ist Kahlers Fall, der 8 Jahre beobachtet werden konnte. Die in der Leisten- und Schultergegend auftretenden Tumoren ließen die zuerst gestellte Diagnose Osteomalacie schon intra vitam sehr zweifelhaft erscheinen. Die mikroskopische Untersuchung eines bei der Sektion erhaltenen Drüsenstückes ergab dann Osteosarkom, sogenanntes Myelom. Infolge dieser Beobachtung unternahm es Kahler, das Krankheitsbild gegenüber der Osteomalacie abzugrenzen und als eine Krankheit sui generis anzusehen.

Differentialdiagnostisch wichtig für sie ist nach seiner Ansicht das Fehlen der Knochenbiegsamkeit und das Auftreten von Knochenanschwellungen. Diese beschränken sich auf das Rumpfskelett und neigen allmählich zu Verbiegungen der Wirbelsäule und zu Spontanfrakturen. Die einhergehenden großen Schmerzen erscheinen in Intervallen, nach denen die Patienten ziemlich schmerzfrei sind. Als Folgeerscheinungen treten neuralgische Schmerzen, Parästhesien, Lähmungen infolge Kompressionsmyelitis, viscerale Algien und Beklemmungen auf. Der Tod erfolgt meist an Marasmus oder einer intercurrenten Krankheit. Nach seiner Meinung handelt es sich auch in den beiden ersten, von Bence Jones und Stokvis beschriebenen Fällen nicht um Osteomalacie, sondern ebenfalls um multiples Myelom. Denn bei Stokvis Patienten, bei dem keine Sektion gemacht wurde, geht die Diagnose aus dem Symptomenkomplex hervor, und als multiples Myelom kann man den mikroskopischen Befund des Tumorstückes im Bence Jones'schen Falle deuten. — Es ist nämlich zu bedenken, daß die Kenntnis der Knochenmarkserkrankungen damals noch recht gering war. Die ersten pathologisch anatomischen Beobachtungen stammen erst von Rustizky 1873. Bei dem Kahler'schen Falle handelt es sich auch nicht um ein eigentliches Myelom, sondern, wie Hirschfeld später nachgewiesen hat, um ein Endotheliom.

Bozzolo brachte 1897 auf dem italienischen Kongreß für innere Medizin den Namen „Kahler'sche Krankheit“ für die zuerst von Kahler beschriebenen Erscheinungen in Vorschlag. Neuerdings hält Sternberg den Ausdruck „Kahler'scher Symptomenkomplex“ für richtiger, da die von Kahler angegebenen Symptome das Krankheitsbild nicht erschöpfen.

Den bei Kahlers Fall im Urin gefundenen Körper bezeichnete Huppert als Heteroalbumose. Ausführliche Untersuchungen über die chemische Natur des Eiweißkörpers brachten ferner Zeehuysen, Matthes, Rosin-Süßmann und Ellinger. Sämtliche Autoren rechneten ihn jedoch ebenfalls zu den Albumosen.

Magnus Levy (1900) war der erste, der den Körper als echtes, genuines Eiweiß erkannte. Er schlug deshalb statt „Albumosurie“ den Ausdruck Bence Jonessche „Albuminurie“ vor, der allgemein anerkannt wurde.

Durch Verdauungsversuche gelang es ihm, in dem Körper Protoalbumose, drei sogenannte sekundäre, durch größeren Ammonsulfatzusatz fällbare, Albumosen und zwei Peptone nachzuweisen. Diese Substanzen hatten dieselben Eigenschaften wie die entsprechenden des Serum albumins und -globulins. Heteroalbumose und Nuklein konnte er jedoch nicht finden. Verdauungsversuche sind schon von Kühne, Matthes und Ribbink angestellt worden. Sie übersehen jedoch die primären Albumosen und fanden nur Deuteroalbumosen und Peptone, da der Körper sehr schnell verdaut wird. Das von Matthes außerdem noch gefundene Nuklein stammt nach Neumeister nicht vom Bence Joneschen Körper, sondern von einem zufällig im Urin vorhandenen Nukleoalbumin. Den fundamentalen Unterschied von Bence Joneschem Körper und Heteroalbumose konnte Magnus Levy durch ihr verschiedenes Verhalten bei einigen weiteren Untersuchungsmethoden klarstellen.

Ferner gelang es ihm, den Körper quantitativ in der Hitze beim erstmaligen Erwärmen durch Fällung auszuscheiden. Es trat dann trotz weiteren Erhitzens

keine Lösung wieder ein. Zu diesem Versuche verdünnte er 10ccm Urin mit 40ccm Wasser und erwärmte langsam auf dem Wasserbade. Je langsamer er erwärmte desto vollständiger war die Ausfällung bei 100°. Er hat somit gezeigt, daß die in der Hitze eintretende Löslichkeit des Niederschlages, die bisher die Veranlassung war, den Körper zu den Albumosen zu rechnen, nur von äußeren Bedingungen abhängig ist.

Als Beweis dafür, daß es sich also um eine den echten Eiweißkörpern nahe stehende Substanz und nicht wie früher angenommen wurde, um einen albumoseähnlichen Körper handelt, führt er drei Punkte an, die nur den echten Eiweißkörpern eigen sind: 1) die Spaltung in die primären und sekundären Verdauungsprodukte der Eiweißkörper bei der Pepsinverdauung, 2) die eben erwähnte vollständige Koagulierbarkeit und 3) die Albuminatbildung. Der Körper steht also über den Albumosen, da er diese Produkte abzuspalten gestattet. Wegen seiner relativen Löslichkeit konnte er jedoch bisher noch in keine bestimmte Gruppe der echten Eiweißkörper eingereiht werden.

Magnus Levy ist es ferner gelungen, durch Zusatz von einer bestimmten Menge von Ammonsulfatlösung nach vier Monaten den Bence Jones'schen Körper zur Kristallisation zu bringen. Auf eine ähnliche Methode stellten Gutterink und de Graaf kristallisierten Bence Jones'schen Körper in größerer Menge dar und machten mit diesem völlig reinem Material Verdauungsversuche. Es gelang ihnen, den Körper bis auf Aminosäuren zu spalten. Leucin, Tyrosin, Histidin, Arginin, Lysin und Glykokoll wiesen sie als Spaltungsprodukte nach. Abderhalden und Rostowski fanden außerdem noch Alanin, Pyrolidin-karbonsäure, Glutaminsäure, Asparaginsäure

und Phenylalanin in dem Körper. Qualitativ zeigte also der Bence Jones'sche Körper dieselbe Zusammensetzung wie die bisher untersuchten Eiweißkörper. Quantitativ steht er dem Serumalbumin und -globulin nahe.

Die Frage, wo und wie der Bence Jones'sche Eiweißkörper zustande kommt, ist bisher noch nicht einwandfrei festgestellt. Die älteren Autoren nahmen allgemein an, daß er ein Produkt der Myelome wäre. Magnus Levy weist zuerst auf das Mißverhältnis von Größe der Tumoren und Menge des ausgeschiedenen Eiweißkörpers hin. Er hält es für sehr unwahrscheinlich, daß von ganz kleinen Geschwülsten täglich bis 70 g des Körpers gebildet werden können. Außerdem liegen Beobachtungen vor, bei denen im Beginn der Krankheit, wo also die Geschwülste erst im Wachsen begriffen sind, die Menge der Ausscheidung am größten war, während sie kurz vor dem Tode immer weniger wurde oder sogar ganz fehlte. Nach seiner Meinung wäre die Bildung des Körpers im ganzen Knochenmark nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Nahe liegender erscheint ihm aber die Annahme, daß er aus dem Nahrungseiweiß stamme. Die Frage, ob der Körper direkt aus dem Nahrungseiweiß oder indirekt erst nach Umwandlung in normales Körpereiweiß in den Harn übergeht, läßt er offen.

v. Dekaſtello hält ebenfalls die Bildung des Körpers im Tumor für ausgeschlossen. Denn es wäre völlig unverständlich, daß die histologisch verschiedenartigsten Tumoren alle denselben Körper bilden sollten. Dann müßte man ihn auch finden, wenn die Tumoren außerhalb des Knochenmarkes sitzen. Er hält nicht die Tumoren selbst, sondern das gereizte, restierende Knochenmark für die Bildungsstätte. Unter dieser

Voraussetzung ließe sich auch die Abnahme der Menge und das völlige Verschwinden des Körpers vor dem Tode erklären, da die Tumoren nach und nach die ganze Markhöhle einnehmen, und kaum noch Mark übrig bleibt.

Voit und Salvendi nahmen an, daß diese eigentümliche Modifikation des Eiweißes nicht in den Tumorzellen selbst, sondern durch die Tätigkeit der Tumorzellen aus dem im Körper zirkulierenden Eiweiß gebildet werden. Ihre Stoffwechselversuche ergaben, daß die Menge der ausgeschiedenen Substanz in erster Linie von der Gesamteiweißzersetzung und in geringem Grade von der Beteiligung des Körpereiwisses abhängig ist.

Bei den von Massini angestellten Stoffwechselversuchen lief die Menge des zugeführten Nahrungseiwisses der des ausgeschiedenen Bence Jones'schen Körpers parallel. Er verlegte jedoch die fermentative Einwirkung nicht wie Voit und Salvendi in die Tumorzellen, sondern wie v. Deckastello in das reißierende, gereizte Knochenmark.

Im Gegensatz zu Massini und Voit und Salvendi war bei Allard und Weber die Ausscheidung von der Art und Menge des zugeführten Nahrungseiwisses unabhängig. — Mir scheint Massinis Ansicht der Wirklichkeit am meisten zu entsprechen.

Abderhalden und Rostoski haben noch nachgewiesen, daß der Bence Jones'sche Körper nicht aus Nahrungseiwiss direkt, sondern erst nach Umwandlung desselben in Körpereiwiss gebildet wird. Diese Entscheidung war bei Magnus Levy offen geblieben. Somit ist bewiesen, daß das Bence Jones'sche Eiweiß kein körperfremdes Eiweiß ist.

Die im Urin gefundene Menge schwankte in den

einzelnen Fällen zwischen $\frac{1}{4000}$ und $6,7\%$. Außer im Urin wurde der Körper noch von Hutchinson, Machod und Askanazy im Knochenmark, von Zeehuysen in den Geschwulstmassen, von Reach in der Milz und von Ellinger in der Ascitesflüssigkeit und im Blute angeblich gefunden. Alle konnten jedoch nur albumoseähnliche Körper nachweisen. Da jedoch recht eingreifende Methoden angewandt wurden, muß man dabei auch an Abspaltung von Eiweißkörpern aus den behandelten Organsubstanzen denken. Einwandfrei konnte aber der Bence Jones'sche Körper im Blute meines weiter unten beschriebenen Falles durch Anaphylaxieverfuche an Meerschweinchen von Abderhalden nachgewiesen werden, was ich schon hier kurz erwähnen möchte.

Interessant ist noch das Verhalten der Nieren dem Bence Jones'schen Körper gegenüber, da bei der Mehrzahl der veröffentlichten Fälle degenerative oder entzündliche Veränderungen an den Nieren beschrieben sind. v. Dekastello hat sich eingehend mit der Frage befaßt und die Fälle daraufhin statistisch zusammengestellt. Er nimmt an, daß nicht der Bence Jones'sche Körper primär die Nieren schädigt, wie bis dahin geglaubt wurde, sondern daß durch die Tumoren auf toxischem Wege schon makroskopisch mehr oder weniger nachweisbare Veränderungen hervorgerufen werden. Nur die geschädigte Niere läßt den Bence Jones'schen Körper hindurchtreten. Dies wird auch durch die Tierversuche von Ellinger, Abderhalden und Rostski und ihm selbst bewiesen; denn bei keinem Versuchstier, das Bence Jones'sche Körper injiziert bekommen hatte, konnte die Substanz im Urin nachgewiesen werden, solange die Nieren intakt waren. Als Übereinstimmung hiermit ist anzusehen, daß der Körper

durch tierische Membranen nicht dialysiert. Da der Körper leichter als Serumeiweiß durch die geschädigten Nieren tritt, wurde öfters zu Lebzeiten nur der Körper im Urin gefunden trotz schwerer Nierenschädigung wie die Sektion später zeigte. Nach seiner Meinung tritt diese toxische Schädigung nur bei Myelomatose auf, während bei Carcinomen und Leukämie, die die Nieren intakt lassen, die Nierenerkrankung eine zufällige Komplikation sein muß. Deshalb findet man den Bence Jones'schen Körper bei solchen Fällen so selten im Urin. Diese Frage kann man entscheiden, wenn man in Zukunft im Blute von Carcinomkranken und Leukämischen, bei denen man Knochenmarksveränderungen vermutet, den Bence Jones'schen Körper zu finden sucht.

Bei allen anerkannten Fällen von Bence Jones'scher Albuminurie hat es sich immer um Knochenmarksveränderungen gehandelt. In der Mehrzahl der Fälle waren es Knochenmarkstumoren. Die bisher beobachteten, dem histologischen Bau nach recht verschiedenen Tumoren kann man einteilen in:

1.) eigentliches Myelom. Dieses wurde bei weitem am häufigsten gefunden. Rustizky definierte diese Geschwulstform als Hyperplasie des normalen Knochenmarkes, die in erster Linie das rote Mark der Wirbel, Rippen und Schädelknochen betrifft. Metastasen in anderen Organen fehlen nach seiner Ansicht. Neuerdings werden die Myelome nach ihrem histologischen Bau eingeteilt. Am häufigsten wurden kleine Lymphozyten, sodann große lymphoide Zellen gefunden. Es sind jedoch auch Fälle von neutrophilen Myelocyten (Sternberg), Plasmazellen (Aschoff, Guccinski und Reichenstein) und sogar Erythroblasten (Ribbert) beobachtet worden,

- 2) Multiple kleinzellige Rundzellenfarkome mit Metastaßenbildung (Stokvis, Buchstab-Schapofchnikows).
- 3) Multiple Chondrosarkome (Seegelken),
- 4) multiple Endotheliome, (Kahler, Markwald)
- und 5) Carcinommetastaßen im Knochenmark (Boson Oerum, Boggs).

Bence Jones'sche Albuminurie ist ferner festgestellt worden bei lymphätischer Leukämie. Askanazy hat als erster einen derartigen Fall beschrieben. Das Leiden begann mit zunehmender Schwellung der Halsdrüsen. Später traten Ödeme der unteren Extremitäten und Auftreibung des Leibes auf. Der Arzt stellte zunächst Nierenentzündung und Geschwulst im Leibe fest. Die genauere Untersuchung ergab generalisierte Drüsen-schwellung, die bei den mesenterialen und abdominalen Drüsen besonders groß war, und eine erhebliche Vermehrung der weißen Blutkörperchen. Es wurden 36 000 weiße Blutkörperchen gezählt, von denen der größte Teil kleine Lymphozyten waren. Der Harn enthielt 1^{0/100} Bence Jones'schen Körper, jedoch kein Albumen. Infolge plötzlich auftretenden Lungenödems Exitus letalis. Bei der Sektion fand man in den Knochen ein dickbreiiges, dunkelfleischfarbenes Mark. Hier und da waren einzelne kleinste, graufleckige Inseln zu sehen. Die Rippenknochen waren so dünn, daß man Pergamentkniftern feststellen konnte. Diese Veränderungen wurden einwandfrei als leukämische diagnostiziert. Die Nieren zeigten cystische Veränderung und einige narbige Einziehungen. Es handelte sich also auch in diesem Falle um eine schwere Veränderung des Knochenmarkes, neben der eine Nierenschädigung einherging.

v. Dekastello hat daraufhin bei 9 Fällen von lym-

phatischer Leukämie genaue Urinuntersuchungen angestellt und 2 weitere Fälle von Bence Jones'scher Albuminurie veröffentlichen können. Es handelte sich beide Male um gut charakterisierte Fälle von lymphatischer Leukämie, bei denen außer dem Bence Jones'schen Eiweißkörper keine Symptome einer Knochenmarkserkrankung vorhanden waren. Im Urin waren mikroskopisch hyaline und grobgranulierte Cylinder, und bei dem einen sogar Erythrozyten zu finden. Interessant ist, daß bei der Radiotherapie die Zusammensetzung des Blutes und der Gesamtzustand der Kranken sich wesentlich änderten, während die Ausscheidung des Körpers immer konstant blieb. Sektion wurde nicht gemacht, da die Patienten ambulant waren. Trotzdem nimmt er an, daß wie bei Askanazys Fall schwere leukämische Knochenmarksveränderungen vorgelegen haben, die infolge der Nierenschädigung zur Bence Jones'schen Albuminurie geführt haben. Jedenfalls ist durch diese 3 veröffentlichten Fälle bewiesen, daß der Bence Jones'sche Körper auch bei leukämischen Veränderungen des Knochenmarkes auftreten kann.

Einige Autoren glaubten, daß auch syphilitische Veränderungen die Bence Jones'sche Albuminurie hervorrufen könnten. Genauere Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß der bei syphilitischen Knochenerkrankungen gefundene Eiweißkörper nicht mit dem Bence Jones'schen identisch war, oder aber, daß die Knochenmarkserkrankung nicht syphilitischer Natur war; trotzdem früher einmal eine Infektion stattgefunden hatte. Bei dem von J. Parkes-Weber beschriebenen Falle gehen Syphilis, die sich durch ein Zungengumma äußerte, und Sarkomatöse Knochenmarksveränderungen nebeneinander her.

Die zunächst als Osteomalacie veröffentlichten Fälle sind später alle als multiples Myelom erkannt worden.

Von den Krankheitserrscheinungen steht außer den Knochenveränderungen in einigen Fällen eine hochgradige Anämie im Vordergrunde. Einen derartigen Fall hat zuerst Ellinger beschrieben. Der Patient kam wegen Frostgefühls, hohen Fiebers, Blässe und leichten Ikterus in Behandlung. Später traten Ödeme und im Urin neben Spuren von Albumen der Bence Jones'sche Körper auf. Das klinische Bild einer progressiven Anämie trat deutlich hervor. Hämorrhagisches Sputum, Haut-, Höhlen- und Gelenkhydrops und Retinalblutungen traten auf, und unter Dyspnoe erfolgte Exitus letalis. Erst in den letzten Lebenstagen fand man geringe Druckschmerzhaftigkeit des Sternums, ein Symptom, daß außer dem Vorhandensein des Bence Jones'schen Körpers im Urin auf eine Knochenmarkserkrankung hinwies. Trotz dieses bei Lebzeiten geringen Befundes von seiten des Skelettsystems fanden sich bei der Sektion auf der Innenseite der Rippen zahlreiche bis haselnußgroße Tumoren. Die abnorme Beweglichkeit der Rippen im Bereiche der Verdickungen wies sogar auf Spontanfrakturen hin. In den Rippen, dem Sternum und den Wirbeln sah man im Mark zahlreiche Veränderungen, die mikroskopisch als Myelome erkannt wurden. Auch in diesem Falle waren die Nieren erkrankt. Seine Beobachtung gab ihm Veranlassung, bei der Verschiedenheit der klinischen Bilder 2 Kategorien aufzustellen: 1.) Fälle, die unter ausgesprochenen Symptomen von seiten des Knochenystems langsam verlaufen, und 2.) Krankheitsbilder, bei denen anämische Erscheinungen mit fortschreitender Entkräftung im Vordergrunde stehen. Die außerordentlichen diag=

nostischen Schwierigkeiten, die die Knochenmarkstumoren bieten, seien jedoch mit einem Schlage behoben, wenn der Bence Jones'sche Körper im Urin zu finden ist. Ein dem von Ellinger beschriebenen ähnlicher Fall ist noch von Anders und Boston beobachtet worden.

In mehreren Fällen stehen Erscheinungen vonseiten des Nervensystems im Vordergrund. Die schweren nervösen Erscheinungen, wie neuralgieforme, ausstrahlende Schmerzen, viscerale Algien und bulbäre Symptome sind nach Senator wohl als degenerative Veränderungen zu erklären, die auf toxischem Wege durch die Tumoren zustande kommen. In einigen Fällen sind auch typische Kompressionserrscheinungen des Rückenmarkes beschrieben, was für eine hochgradige Zerstörung der Wirbelkörper spricht.

Zu erwähnen wäre noch, daß bei einem von Fitz beschriebenen Falle Bence Jones'sche Albuminurie bei einer Frau mit Myxödem aufgetreten ist. Außerdem bestanden Schmerzen in den Schultern und Steifigkeit in den Gliedern. Da keine Sektion gemacht wurde, schien durch die Veröffentlichung dieses Falles zunächst die bisherige Annahme, daß das Auftreten des Bence Jones'schen Körpers im Urin nur beweisend für schwere Knochenmarksveränderungen sei, nicht immer zutreffend zu sein. Später kam man jedoch zu der Erkenntnis, daß das Myxoedem, das durch Thyreoidin-tabletten gebessert wurde, während die Bence Jones'sche Albuminurie unverändert weiter bestehen blieb, neben einer Knochenmarkserkrankung einherging. Die Frau ist jedoch gestorben, bevor die Knochenmarkserkrankung größere Beschwerden gemacht hat.

Nach den veröffentlichten Fällen ist die Bence Jones'sche Albuminurie eine Erkrankung, von der in

erster Linie das höhere Lebensalter betroffen wird. Frauen erkrankten viel seltener als Männer daran. Als Ursache wurde in einer Reihe von Fällen ein längere Zeit vorausgegangener Unfall angegeben. Die Dauer der Krankheit schwankte zwischen einigen Wochen und 8 Jahren. Heilung wurde bisher nicht beobachtet.

Therapeutisch steht man der Krankheit machtlos gegenüber. Da man einen günstigen Einfluß durch Arsenbehandlung bei malignen Lymphomen gesehen hatte, schlug Zahn diese Therapie wegen der Ähnlichkeit dieser beiden Erkrankungen auch bei Myelomen vor. Bisher sind jedoch bei Myelomen keine Erfolge damit verzeichnet.

Nachdem im Vorstehenden ein kurzer Überblick der wichtigsten Erfahrungen gegeben wurde, zu denen die bekannt gewordenen Fälle von Bence Jones'scher Albuminurie geführt haben, berichte ich über einen von Prof. Winternitz beobachteten Fall, den er mir zur Bearbeitung übergeben hat.

Anamnese:

R. St., Kaufmann, 65 Jahre alt, stammt aus einer gesunden Familie. Vor 24 Jahren bekam er Gelenkrheumatismus, der nach mehreren Wochen ausheilte. Jedoch hatte er seit dieser Zeit an Ischias zu leiden und ging deswegen jedes Jahr einige Wochen ins Bad. Im Juli 1916 glitt er beim Besteigen der Straßenbahn aus und fiel rückwärts auf das Straßenpflaster. Hierbei renkte er sich die rechte Schulter aus. Außerdem hatte er über starke Schmerzen im Kreuz und auf der ganzen rechten Seite zu klagen. Nach mehrwöchentlicher Krankenhausbehandlung war er angeblich völlig wiederhergestellt. Im November 1917 traten im Anschluß an eine kleine Anstrengung wieder Schmerzen

an der rechten Hüfte und im Rücken auf. Im Februar 1918 wiederum nach körperlicher Anstrengung ähnliche Schmerzen von großer Heftigkeit in der linken Rippen- und Lendengegend. Seitdem ist das Allgemeinbefinden immer schlechter geworden. Er fühlte sich matt und hatte am ganzen Körper über heftige Schmerzen zu klagen, die bald hier, bald dort auftraten. Hartnäckige Verstopfung setzte ein. Er wurde bettlägerig. Der Hausarzt fand Eiweiß im Urin und stellte „Nierenentzündung“ fest. Ende März anhaltende Kopfschmerzen und ein, wenn auch nur vorübergehend, verwirrtes, aufgeregtes und verändertes Wesen. Kein Erbrechen. Im übrigen schwankte der Zustand wochenlang, bis er in den letzten Tagen des Aprils eine zunehmende Verschlechterung erfuhr. Am 1. Mai stellte sich Luftmangel ein und bald darauf Bewußtlosigkeit. Nach energischen Hautreizen kehrte die Befinnung allmählich wieder zurück. Am nächsten Tage wurde der Patient ins Krankenhaus aufgenommen.

Status am 2. V. 18.

Großer, kräftig gebauter Mann mit gut entwickelter Muskulatur und sehr reichlichem Fettpolster. Gesichtsfarbe und sichtbare Schleimhäute sehr blaß.

Zunge wird gerade herausgestreckt und ist nicht belegt.

Pupillen gleichweit, reagieren auf Lichteinfall.

An den inneren Organen sind keine wesentlichen Veränderungen nachzuweisen.

Sensorium nicht getrübt; jedoch liegt Patient apathisch da und gibt nur schwerfällig auf Fragen Antwort. Keine Lähmungserscheinungen.

Die Gegend zu beiden Seiten der Wirbelfäule, das Becken und einzelne Rippen werden als druck=

schmerzhaft angegeben. Jedoch bleiben die Punkte bei öfteren Betaften nicht konstant. Knochenauftreibungen oder Tumoren sind nirgends zu fühlen.

Bei der Augenuntersuchung findet sich auf dem linken Augenhintergrunde neben der Papille kleine Blutungen. Keine Retinitis albuminurica.

Blutbefund: Einfache Anämie, keine Anzeichen für perniciöse Anämie oder Leukämie.

Blutdruck 130 mm Hg.

5. V. 18. Vormittags plötzlich Anfall von heftigen klonischen Krämpfen in beiden Armen und Beinen, besonders links, klonische Zuckungen der Augäpfel nach links und tiefe Bewußtlosigkeit. Allmählich löste sich der Anfall. Bewußtfeinstrübung blieb jedoch zurück.

Am Nachmittag Wiederholung des Anfalles in gleicher Weise.

Abends ziemlich plötzlich ohne Zuckungen Exitus letalis.

Während der Beobachtungstage war Patient immer fieberfrei. Der Puls schwankte zwischen 80 und 100 Schlägen in der Minute. Die Urinmenge betrug 1000 bis 1350 ccm pro die. Spezifisches Gewicht 1009-1010.

Der Urin war hellgelb, klar, zuweilen auch etwas trübe. Wenig weißflockiger Bodensatz. Reaktion war sauer. Mikroskopisch fanden sich sehr zahlreiche, kurze granulierten Cylinder, daneben zellige Elemente aus der Niere und den Harnwegen. Außerdem sah man einen Rasen von kleinsten, farblosen Körperchen und Kügelchen.

Beim Erhitzen des Harns beginnt bei 55° eine rasch zunehmende Trübung, die dann bei ungefähr 60° vollständig ist. Bei 70° fängt der Urin wieder an, sich aufzuhellen. Bei 80° ist völlige Lösung eingetreten

Beim Erkalten tritt bei etwa 75° wieder Ausfällung auf, die rasch zunimmt, jedoch nicht mehr so stark ist, wie vorher.

Schon dieses Verhalten - Eiweißausfällung beim Erwärmen auf ungefähr 50° , Lösung beim Kochen - läßt kaum einen Zweifel darüber aufkommen, daß wir es mit dem so charakteristischen Bence Jones'schen Eiweißkörper zu tun haben. Die weiteren Reaktionen konnten diese Annahme nur bestätigen.

Zuweilen blieb trotz längeren Kochens eine leichte Trübung bestehen, ein Zeichen, daß neben dem Bence Jones'schen Eiweißkörper auch noch anderes, natives Eiweiß vorhanden war. Die Menge dieser Globuline schwankte an den einzelnen Tagen. In allen zweifelhaften Fällen, in denen der Bence Jones'sche Körper durch anderes Eiweiß verdeckt werden könnte, ist es daher ratsam, den Harn heiß zu filtrieren und dann abzuwarten, ob beim Erkalten Fällung eintritt. Als dann ist der Versuch zu machen, sie durch Erhitzen wieder in Lösung zu bringen.

Erwärmt man den Urin und setzt nach Eintritt des Niederschlages verdünnte Salpetersäure zu, so tritt teilweise Lösung ein. Diese Lösung bleibt aus, wenn man dem Urin Kochsalz zusetzt, bzw. es tritt nach der durch Kochen erfolgten Lösung sofort wieder Fällung bei Zusatz von Kochsalz ein.

Bei Zusatz von verdünnter Salpetersäure in der Kälte fällt ein dicker, weißer Niederschlag aus; durch Schwefelsäure desgleichen. Bei Unterschichtung von Salzsäure tritt ein starker Eiweißring auf.

Mit Essigsäure und Ferrocyankalium entsteht leichte Trübung, die bei verdünntem Urin etwas stärker ist.

Durch Alkohol erfolgt Fällung.

Die Binnetprobe des Urin gibt die charakteristische rotviolette Färbung.

Mit Esbachs Reagens $2\frac{1}{2}\frac{0}{00}$ Eiweiß.

Klinische Diagnose: Bence Jones'sche Albuminurie mit multiplen Myelomen. Nephrose.

Am 6. V. 18. wurde von Geheimrat Beneke die Sektion ausgeführt!

Befund:

Großer, sehr kräftig gebauter Mann. Haut ausgeprägt bleich, prall. Gutes Fettpolster, Muskulatur kräftig. Keine Ödeme.

Herzbeutel normal. Herz groß, etwas schlaff, blaß, weit. Keine Verfettungen. Normale Klappen.

Beide Lungen blutreich, stark ödematös. Bronchi o. B. Keine Pneumonie.

Milz mäßig vergrößert, weich, dunkelrotbräunlich, stark eisenhaltig, etwas quellend.

Nebennieren groß, prall, nicht fetthaltig, braungelb. Nieren sehr groß; Kapsel leicht abzulösen. Oberfläche glatt, nicht feucht. Rinde blaßgrau, normale Zeichnung, nicht quellend. Keine Herderkrankung. Nierenbecken und Blase o. B. Prostata groß, Samenblasen sehr stark gefüllt, Hoden sehr groß, prall, hellgraugelb.

Leber mittelgroß. Oberfläche diffus feinhöckrig, dunkelbraunrot. Schnittfläche etwas derb, aber nicht höckrig, sehr braunrot, eisenreich. Azini nicht deutlich abgegrenzt. Keine Inselbildung. Gallenblase groß, enthält reichlich Galle.

Magenschleimhaut mäßig dick, blaß. Darm stark entwickelt, o. B. Retroperitonealdrüsen unverändert.

Die Wirbelfäule ist im unteren Abschnitte durch reichliche, frischere, spondylitische Excrescenzen auf beiden Seiten der breiten Lendenzwischenwirbelscheiben

etwas unförmlich breit. Letztere sind, namentlich die 1.-4., stark degeneriert, fast völlig durch große, horizontale Sprünge unterbrochen, trocken und brüchig. Der 2. Lendenwirbel ist völlig in sich zusammengeknickt. Er enthält außer dichtem Knochengewebe mehrfach trockne, gelbe, nekrotische Teile, sowie einige undeutlich als Geschwulstmasse zu erkennende, graurötliche, quellende, weiche Massen. Eine mäßig große, höckrige Wucherung dringt bis gegen die Dura spinalis von der Hinterfläche des Wirbels vor. Die anstoßenden Wirbel sind mehrfach durch ein Geschwulstgewebe durchsetzt, das von dem im allgemeinen dunkelgrauroten Knochenmark nur durch etwas größere Feuchtigkeit und leichtes Vorquellen zu unterscheiden ist. Die Geschwulstknoten nehmen zum Teil Lücken im Knochengewebe ein, ohne daß die anstoßende Spongiosa irgendeine Reaktion aufweist. Der 3. Lendenwirbel zeigt noch etwas Einknickung. Die Erkrankung läßt sich bis in die oberen Brustwirbel verfolgen. Das Sternum und die Beckenknochen enthalten eine mehr diffuse, dunkelgraurote Markmasse, die nicht mit Sicherheit als Tumor erkannt werden kann. Die Rippen zeigen ähnliches Mark. An der 5. Rippe ist innen unter der Pleura ein halbpflaumengroßer, knolliger Geschwulstknoten ausgewachsen, der einer Frakturstelle der Rippen entspricht.

Die Sekion konnte nicht weiter geführt werden, da die Angehörigen nur die Eröffnung der Brust- und Bauchhöhle zugegeben hatten.

Diagnose post mortem:

Multiple Myelome des Knochen systems, leichte Nephritis, Lungenhyperämie und -ödem, beginnende Leberscirrhose mit Milztumor und starker Siderosis.

Von besonderer Bedeutung ist der Nachweis des Bence Jones'schen Eiweißkörpers im Blute des Patienten, der von Prof. Abderhalden erbracht wurde. Das von 100 ccm Blut ausgepreßte Serum wurde mit der zehnfachen Menge Wasser verdünnt und nach Zusatz von 10% Kochsalz aufgeköcht. Die Lösung wurde vom entstandenen Eiweißniederschlag heiß abfiltriert. Trichter und Auffangegefäß waren erwärmt. Man erhielt ein ganz klares Filtrat, wenn man es in kochendes Wasser tropfen ließ. Bei etwa 60° trat Opalescenz auf. Beim weiteren Abkühlen wurde die Trübung stärker, bis schließlich flockiger Niederschlag eintrat. Beim Wiedererhitzen löste sich der Niederschlag zum größten Teil. Ganz klar wurde die Lösung jedoch nicht. Vom Ungelösten wurde heiß filtriert. Beim Erkalten trat wieder der Niederschlag auf. Beim wiederholten Versuch blieb wiederum beim Erhitzen eine leichte Trübung bestehen, die abfiltriert wurde. Es ist wohl darnach als sicher anzunehmen, daß der beim Abkühlen ausgefallene Niederschlag eine physikalische Veränderung eingeht.

Mit diesem, aus dem Serum gewonnenen Bence Jones'schen Eiweißkörper wurde ein Anaphylaxieversuch gemacht. Einem Meerschweinchen wurde etwa 0,1 g Eiweiß einverleibt. Der Eiweißkörper wurde in heißem Wasser aufgenommen, und von der auf etwa 40° abgekühlten, trüben Lösung wurde in die Bauchhöhle eingespritzt. Das Kontrolltier erhielt dieselbe Menge Menschenferumeiweiß. Nach 21 Tagen wurde bei denselben Tieren Bence Jones'scher Eiweißkörper eingespritzt. Bei dem mit Bence Jones'schem Eiweiß vorbehandelten Tiere traten die typischen Erscheinungen der Anaphylaxie auf. Das Tier wurde unruhig und

bekam Krämpfe. Kotentleerung trat ein. Die Temperatur sank auf 30°. Nach kurzer Zeit Exitus. Das Befinden des Kontrolltieres war dagegen kaum gestört.

Der Versuch wurde bei 2 anderen Tieren wiederholt, jedoch mit dem Unterschied, daß statt des Bence Jones'schen Eiweißes bei der Reinjektion diesmal Serum-eiweiß verwandt wurde. Hierbei zeigte sich, daß nun das mit Serum vorbehandelte Tier die typischen Erscheinungen des Shokes bekam; während das mit Bence Jones'schem Eiweiß vorbehandelte Tier gesund blieb.

Durch diese Versuche ist bewiesen, daß der Bence Jones'sche Eiweißkörper auch im Blute des Patienten vorhanden war.

Wenn man das gesamte Krankheitsbild in diesem Falle noch einmal kurz zusammenfaßt, so ist als sicher anzusehen, daß die ersten Krankheitserscheinungen, die - bei nachträglicher Würdigung - als Zeichen einer multiplen Knochenmarkserkrankung gedeutet werden können, im Anschluß an den im Jahre 1916 erlittenen Unfall sich einstellten. Der schwere, fettleibige Mann glitt beim Besteigen eines Straßenbahnwagens aus und fiel hart mit der rechten Schulter auf das Straßenpflaster auf. Außer der Schulterverrenkung bestanden noch heftige Schmerzen im Kreuz und auf der ganzen rechten Seite. Diese traten nach körperlicher Anstrengung 1917 und im Februar 1918 zeitweilig wieder auf und verbreiteten sich schließlich über den ganzen Körper, ohne daß bestimmte Schmerzdruckpunkte hätten angegeben werden können. Da im Urin Eiweiß war, stellte der Arzt „Nierenentzündung“ fest. Ein Anfall von Bewußtlosigkeit wurde als urämische Erscheinung aufgefaßt. Bei der Aufnahme bestand Apathie, große

Blässe und Schmerzhaftigkeit am ganzen Körper. Patient machte einen schwerkranken Eindruck. Im Urin war neben zahlreichen, kurzen, granulierten Cylindern der Bence Jones'sche Eiweißkörper vorhanden. Der Bence Jones'sche Eiweißkörper wurde ferner noch im Blute nachgewiesen. 3 Tage später nach zweimaligem apoplektiformen Anfällen Exitus. Die Sektion bestätigte die bei Lebzeiten gestellte Diagnose: multiple Myelome mit Nephrose.

Bei dem beobachteten Falle sind also eine ganze Reihe von Symptomen vorhanden, wie sie bei zahlreichen anderen Fällen dieser Erkrankung gefunden sind. Der Kranke war ein Mann im höheren Lebensalter. Als Krankheitsursache wird ein Unfall angegeben. Es erhebt sich nun die Frage, ob das vorhin geschilderte Trauma wirklich für die Entstehung der Knochenkrankung verantwortlich gemacht werden kann. Die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen; vor allem ist nicht auszuschließen, daß durch das Trauma Krankheitsherde mobilisiert wurden, oder daß wenigstens auf ihre Entwicklung ein beschleunigender Einfluß ausgeübt wurde. Die Frage kann unter Umständen vom Standpunkte der Unfallgesetzgebung große praktische Bedeutung gewinnen. Knochenverbiegungen und Spontanfrakturen konnten bei Lebzeiten wegen der Adipositas, der Schmerzempfindlichkeit und der Schwerfälligkeit des Patienten nicht festgestellt werden. Ihr Vorhandensein wurde jedoch durch die Sektion bestätigt. Perioden von heftigen Schmerzen wechselten mit völlig schmerzfreien Zeiten. Auch hier bestand eine hochgradige Anämie. Im Urin macht das zeitweilige Auftreten von nativem Eiweiß neben dem Bence Jones'schen Körper schon bei Lebzeiten auf eine bestehende

Nierenerkrankung aufmerksam, die durch die Sektion bestätigt wurde. Wertvoll für die weitere Erforschung der Krankheit ist der Nachweis des Bence Jones'schen Körpers im Blute des Patienten. Stoffwechselversuche konnten nicht gemacht werden, da der Patient moribund in Behandlung kam und nur wenige Tage in Beobachtung war. Die Krankheit hatte ungefähr 2 Jahre nach dem Auftreten der ersten „rheumatischen“ Anzeichen zum Tode geführt.

Dieser Fall hat von neuem bewiesen, daß das Vorhandensein des Bence Jones'schen Eiweißkörpers im Urin von größter diagnostischer Bedeutung bei Affektionen des Knochenmarkes ist, die auf Geschwulstbildung oder lymphatische Leukämie beruhen.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Winternitz für die Überlassung des Falles und die gütige Unterstützung bei der Anfertigung der Arbeit meinen besten Dank auszusprechen.

Literaturverzeichnis.

1. Abderhalden: Ein Fall von Bence Jones'scher Albuminurie. Zeitschrift für physiol. Chem. 1919. Bd. 106.
2. Abderhalden u. Rostoski. Beiträge zur Kenntnis des Bence Jones'schen Eiweisskörpers. Zeitschrift f. physiol. Chem. 1905.
3. Aschoff. Pathologische Anatomie 1913.
4. Askanazy. Über die diagnostische Bedeutung der Ausscheidung des Bence J. Körpers durch den Harn. D. Arch. f. kl. M. 1900.
5. Boston. Bence Jones albumosuria with peculiar nervous phenomena. D. med. Wochenschr. 1903. Literaturbeilage.
6. Cohn. Ueber Bence J. Albuminurie. Inaug. Diss. Giessen 1912.
7. v. Dekastello. Beiträge zur Kenntnis der Bence Jones'schen Albuminurie. Zeitschr. f. klin. Med. 1909. Bd. 67.
8. Ellinger. Das Vorkommen des Bence Jones'schen Eiweisskörpers im Harn bei Tumoren des Knochenmarkes und seine diagnostische Bedeutung. D. Arch. f. klin. Med. 1899 Bd. 62.
9. Jochmann u. Schumann. Zur Kenntnis des Myeloms. Münch. med. Wochenschr. 1901 u. Zeitschr. f. klin. Med. 1902 Bd. 46.
10. Kahler. Zur Symptomatologie des multiplen Myeloms. Prager med. Wochenschr. 1889.
11. Kühn. Ueber Hemialbumosen im Harn. Zeitschr. f. Biol. 1883.
12. Magnus Levy. Ueber den Bence Jones'schen Eiweisskörper. Zeitschr. für physiol. Chemie 1900. Bd. 30.
13. Massini. Untersuchungen bei einem Fall von Bence Jones'scher Krankheit. D. Arch. f. klin. Med. Bd. 104.
14. Mohr. V. Noordens Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels. II., 864 1907.
15. Mohr u. Staehelin. Handbuch der inneren Medizin 1912. B. 4.
16. Neubauer-Hupperts Lehrbuch. Analyse des Harns. 1913. II. S. 1184.
17. Rustizky. Multiple Myelome. D. Zeitschr. f. Chirurg. 1873. B. 3.
18. Sexsmith. Multiple Myelome mit Bence Jones'scher Albuminurie. Centralblatt für innere Med. 1916.

19. Strub. Ueber Bence Jones. Albuminurie. Ing.-Diss. Erlangen 1905.
 20. Süssmann Ueber einen neuen Fall von multipler Myeloidbildung, verbunden mit hochgradiger Albumosurie. Inaug.-Diss. Leipzig 1897.
 21. Voit u. Salvendi. Zur Kenntnis der Bence Jonesschen Albuminurie. Münch. med. Wochenschr. 1904. Bd. 29.
 22. Parkes Weber. Multiple Myelome u. Albumosurie. D. med. Wochenschr. 1903. Vereinsbeilage Nr. 18.
-

Lebenslauf.

Verfasser vorliegender Arbeit, Hans Kirft, wurde am 20. März 1892 als Sohn des verstorbenen Direktors Adolf Kirft in Halle a. S. geboren. Er ist evangelischer Konfession und preussischer Staatsangehöriger. Nach Erlangung des Reifezeugnisses Michaelis 1911 am Stadtgymnasium zu Halle a. S. bezog er die Universität Halle-Wittenberg. Im März 1914 bestand er das Physikum. 1914-1918 war er Kriegsteilnehmer. Am 29. September 1919 bestand er das medizinische Staatsexamen in Halle a. S. und erhielt gleichzeitig von Berlin die Approbation als praktischer Arzt.

